

# ●●● CARBENDER 50

## f u n g i c i d a

**COMPOSICIÓN:** Carbendazima 50% p/v

**FORMULACION:** SC

**PRESENTACIÓN:** 1 y 5 litros

### CARACTERÍSTICAS

**CARBENDER 50** es un fungicida de amplio espectro presentado en forma de suspensión concentrada, consiguiendo un efecto preventivo y curativo sobre numerosas enfermedades producidas por hongos endoparásitos.

### APLICACIONES AUTORIZADAS

- Albaricoquero, Almendro, Melocotonero y Nectarino: Fusicocum, Monilia y Oidio en dosis de 0,05%
- Ciruelo: Monilia y Oidio en dosis de 0,05%
- Frutales de pepita: Monilia, Moteado y Oidio, en dosis de 0,06%
- Platanera: Mal de Panamá, en dosis de 0,06%
- Vid: Botritis y Oidio, en dosis de 0,06%
- Tomate y Pepino: Botritis, en dosis de 0,06%
- Remolacha azucarera: Cercospora, en dosis de 0,06%
- Leguminosas de grano: Antracnosis y Fusarium, en dosis de 0,06%
- Trigo, Cebada y Triticale: Fusarium, Mal de Pie y Oidio, en dosis de 0,06%
- Arbustos ornamentales: Antracnosis, Fusarium y Oidio, en dosis de 0,06%
- Ornamentales herbáceas: Antracnosis, Botritis, Fusarium y Oidio, en dosis de 0,06%

### DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización normal a la dosis general de 0,05-0,06% (50-60 cc/hl). Las aplicaciones pueden realizarse de forma preventiva, cuando las condiciones ambientales sean favorables al desarrollo de la enfermedad, repitiendo el tratamiento en caso necesario a los 15-20 días del anterior. También se puede aplicar como tratamiento curativo a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.



**salquisa** ●●●  
agrocencias

●●● **CARBENDER 50**

**f u n g i c i d a**

### PLAZO DE SEGURIDAD

Entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero, o entrada de ganados, han de transcurrir: 35 días para cereales (Trigo, Cebada y Triticale) y 15 días para el resto de cultivos. En Ornamentales no procede.

### CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA

T (Tóxico), N (Peligroso para el medio ambiente)

Tóxico para la reproducción cat. 2.

Mutagénico cat. 2.

### OBSERVACIONES

Se recomienda hacer una suspensión previa en una pequeña cantidad de agua y luego verterla al tanque con el agitador en marcha. Es aconsejable alternar su aplicación con la de otros productos pertenecientes a distintos grupos químicos para evitar la aparición de resistencias. CARBENDER 50 es compatible con la mayoría de los productos empleados en los cultivos recomendados, excepto los de reacción alcalina. En caso de mezcla desconocida realizar una prueba previa y/o consultar al Departamento Técnico.

Nº de Registro: 22.273

**salquisa** ●●  
agrociencias

